

La Asamblea Nacional nº 65 año 2021 en el contexto de pandemia y  
el Departamento Médico de Bomberos de Chile

De acuerdo a las normas de cuidado establecidas para la condición de pandemia que vive el territorio nacional y la fase 3 determinada para la Región Metropolitana, el departamento de Prevención de Riesgos y el Departamento Médico en un trabajo conjunto, puso en marcha en el campus ANB los días 31 de julio y 1 de agosto, para garantizar al máximo la seguridad de los asistentes frente a una probabilidad de contagio por el Virus SARS CoV2, el protocolo establecido hace algunos meses para reiniciar la actividad presencial de capacitación. En esta ocasión se implementó para las autoridades y visitas invitadas al evento, la toma de muestra para el examen específico que permite hacer el diagnóstico de la enfermedad por el virus responsable de la actual pandemia, utilizando el Test de antígeno Novel Coronavirus Nanjing Norman Biological Tech. Este test detecta directamente el virus covid19 desde el día 2 de la infección en forma similar al PCR, se realiza mediante un hisopo nasofaríngeo, orofaríngeo o saliva, tiene una sensibilidad de 93,21% y especificidad de 99,29% y entrega resultado en 15 minutos. La toma de muestras y análisis de los resultados se efectuó en las dependencias de la JNB y del Campus, con la participación del equipo de Prevención de Riesgos y Enfermería del Campus bajo la asesoría y supervisión del DMN, aplicándose un total de 98 test los que en su totalidad resultaron negativos. Durante ambos días el equipo médico del DMN se encargó además de atender un reducido número de consultas médicas del grupo de asistentes a la actividad programada. El test de antígeno utilizado, por sus características no invasivas, de fácil aplicación, rápido resultado y alta especificidad constituye una ayuda más para controlar la diseminación del COVID 19. El DMN de acuerdo a las recomendaciones internacionales y del MINSAL, recuerda que a pesar de la disminución de los contagios de estas últimas semanas y de algunas medidas de desconfiamiento, es necesario perseverar en el uso de mascarillas de tipo quirúrgica o NK 95 (las de tela no brindan ninguna protección), mantener el distanciamiento físico (1.8mt), evitar las aglomeraciones en recintos cerrados, ventilación de los espacios cerrados con corriente de aire por 20 minutos, usar protección ocular, evitar fumar, cantar o gritar (peligro de emisión de aerosoles) en lugares confinados y recurrir al lavado frecuente de manos con

agua y jabón utilizando también el uso de cloro domiciliario para el aseo de superficies.

En la medida que mantengamos estas normas sanitarias básicas y se cumpla en forma oportuna con los programas establecidos de vacunación, podremos tener una menor posibilidad de vivir la tercera ola que actualmente está sufriendo el continente europeo y otras áreas geográficas que relajaron en forma considerable las medidas de prevención a las que además se ha sumado un nuevo factor como es la aparición de la variante Delta.

Foto test antigéno




Foto toma de muestra





Foto equipo DMN enfermería Campus

